

Calendrier de régie apicole en milieu nordique.

Nicolas Tremblay agr. CRSAD.
Ève-Catherine Desjardins, CEDFOB.

Fin Avril-Début Mai	Mai	Mai	Juin-Juillet
<ul style="list-style-type: none"> • Débaler les ruches dès que la température ne descend plus sous 8°C. • Ne pas ouvrir les ruches. • Retirer les abeilles mortes sur le tiroir et dans l'entrée des ruches. • Peser les ruches, donner 10 litres de sirop de sucre 1:1 aux ruches trop légères. 	<p><u>Début de l'ouverture des ruches</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • À partir de 12°C. Ouvrir rapidement les ruches sans retirer les cadres. • À partir de 16°C. Évaluer la force, les réserves et vérifier la présence de la reine ou de ponte. • Donner 3 litres de sirop 1:1 et une galette de substituts protéiques au besoin, soit si moins de 20% de cadres de sirop et moins de 10% de cadre de pollen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacer les cadres de réserve excédentaires par des cadres vides disposés près du cœur de la ruche afin de permettre la ponte de la reine. • Gratter les excédents de cire et dépister la varroase. 	<p><u>Attention période d'essaimage</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivre la force, les réserves et la présence de la reine ou de ponte. • Éliminer les cellules royales. • S'assurer qu'il y ait toujours de l'espace pour la ponte près du cœur de la ruche. • Ajouter une demi-hausse dès que la colonie compte au moins 6 cadres de couvain et 9 cadres d'abeilles.
Juin-Juillet	Août	Septembre	Octobre-Novembre
<p>Au besoin...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduire une nouvelle reine. • Produire des nucléis. • Donner 3 litres de sirop 1:1 et une galette de substituts protéiques, <i>Idem</i> à mai. • Ajouter un garde reine et une demi-hausse à miel seulement en présence de 1 ½ hausse à couvain dont la dernière demi-hausse possède 5 à 6 demi-cadres de couvain. • Dépister la varroase. 	<p><u>Août, début de la préparation hivernale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Suivre la force, les réserves et la présence de la reine. Au besoin, donner 3 litres de sirop 1:1 et une galette. • Début août, libérer de l'espace près du cœur de la ruche pour stimuler la production de couvain en grippant les cadres de couvain excédentaires ou plus âgés au-dessus du garde-reine. • Récolter le miel jusqu'à la fin du mois. • Fin août, descendre les ruches à une seule hausse avec 6 cadres de couvain. • Dépister la varroase. 	<p><u>Mi-septembre, nourrissage automnal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Donner 24 litres de sirop 1:1 par ruche en 2 fois sur 2 semaines. • Début du traitement automnal de la varroase, si nécessaire. 	<ul style="list-style-type: none"> • Finaliser les traitements automnaux contre la varroase. • Retirer les nourrisseurs. • Installer les isolations hivernales de type emballage en novembre dès que les températures descendent sous les 0°C. • Enlever les tiroirs le plus tard possible.